СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 33 от 16.05.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «АМОКСИФАРМ 20%»

1. Торговое наименование.
АМОКСИФАРМ 20%.

2. Международное непатентованное наименование.
Амоксициллин (Amoxicillin).

3. Регистрационный номер.
8238-10-22 БА.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Порошок от белого до желтого цвета.

5. Состав.
В 1 г препарата содержится 200 мг амоксициллина тригидрата; наполнитель (декстроза моногидрат).

6. Фармакотерапевтическая группа.
Противомикробные средства. Антибиотики из группы пенициллинов.

7. Фармакодинамика и механизм действия.
Амоксициллин – полусинтетический антибиотик из группы пенициллина, обладает широким спектром противомикробного действия. К амоксициллину чувствительны Staphylococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Campylobacter spp., Brucella spp., Salmonella spp., Escherichia coli, Haemophilus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum, Proteus spp. и другие.
Механизм действия препарата заключается в нарушении синтеза клеточной стенки бактерии путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактерий.
Амоксициллин хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и быстро распределяется во всех органах и тканях организма, в терапевтической концентрации в крови содержится в течение 8-12 часов.
Выделяется амоксициллин в основном с мочой и, в меньшей степени, с каловыми массами.
Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.
АМОКСИФАРМ 20% применяют молодняку крупного рогатого скота, свиньям, сельскохозяйственной птице (цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур), собакам для лечения инфекций дыхательной, пищеварительной и мочевыводящей систем и других болезней, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину.

9. Противопоказания.
Препарат запрещен к применению птицам-несушкам, чьё яйцо используется в пищу людям.

10. Способ применения и дозы.

АМОКСИФАРМ 20% применяют 2 раза в сутки телятам и поросятам орально в смеси с кормом, водой или молоком в дозе 0,5 – 1,0 г на 10 кг массы тела в течение 5 – 7 дней.

Птице препарат применяют в первой декаде жизни из расчета 50 г на 400 л воды, в последующие периоды 50 г на 200 л воды в течение 3 – 5 дней или 0,04 г на кг массы тела птицы.

Собакам препарат применяют в дозе 20 – 50 мг/кг 2 раза в сутки в течение 3 – 5 дней.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.

При применении препарата возможны аллергические реакции. При наличии побочных эффектов применение препарата прекращают, назначают антигистаминные препараты и препараты кальция.

13. Беременность и период лактации.

Препарат противопоказан в период беременности и лактации.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока применения препарата – следует применить его как можно быстрее, в той же дозе и по той же схеме.

15. Побочное действие.

При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Запрещается совместное применение препарата с сульфаниламидами, антибиотиками групп тетрациклина, амфеникола, макролидами и линкозамидами.

17. Форма выпуска.

Пакеты из полимерных комбинированных материалов по 100, 500 г, 1 кг.

Мешки из бумаги и комбинированных материалов по 3, 5, 10, 20, 25 кг.

18. Срок годности.

Срок годности - 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°С до 25°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Убой животных, птиц на мясо разрешается через 15 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарных лекарственных

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

Адрес производства: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91/1, район д. Большой Тростенец.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.