СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 15 от 10.03.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «ФЕНБЕНДАФАРМ 22,5%»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 ФЕНБЕНДАФАРМ 22,5% (PHENBENDAPHARMUM 22.5%).

Международное непатентованное наименование активной фармацевтической субстанции: фенбендазол.

Лекарственная форма: порошок для приема внутрь.

1.2 Препарат представляет собой порошок светло-серого цвета. Хорошо смешивается с влажным кормом. Препарат высокоустойчив при хранении.

В 1 г препарата содержится 225 мг фенбендазола и наполнитель (декстроза моногидрат).

1.3 Препарат выпускают в пакетах из полимерных комбинированных материалов по 100 г, 500 г и 1 кг и мешках из бумаги и комбинированных материалов по 5, 10, 20 и 25 кг.

1.4 Препарат хранят и транспортируют в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С.

1.5 Срок годности - 3 (три) года от даты производства при условии соблюдения правил хранения. Не применять по истечении срока годности. Хранить в недоступном для детей месте. Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.6 Условия отпуска: отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Фенбендазол, входящий в состав препарата, обладает широким спектром антигельминтного действия. Препарат активен в отношении взрослых форм, личинок и яиц нематод желудочно-кишечного тракта и некоторых цестод.

Фенбендазол губительно действует на гельминтов, паразитирующих у крупного рогатого скота, овец и коз *(Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Capillaria spp., Trichocephalus spp., Strongyloides spp., Dictyocaulus filaria, Moniezia spp.)*; лошадей *(Strongylus spp., Ascaris spp., Strongyloides spp., Oxyuris spp., Parascaris spp.)*; свиней *(Hyostrongylus spp., Oesophagostomum spp., Ascaris suis, Trichuris suis, Metastrongylus spp.)*; собак *(Toxocara canis, Toxocara leonia, Toxocara mystax, Ancylostoma spp., Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Taenia pisiformis, Giardia spp.)* и кошек *(Toxocara mystax, Ancylostoma tubaeforme, Aelurostrongylus abstrusus, Taenia pisiformis)* и др.

2.2 Фенбендазол повреждает целостность клеток гельминтов, нарушает синтез белка, углеводный обмен и ингибирует активность фумаратредуктазы у гельминтов. Препарат вызывает гибель взрослых и личиночных форм гельминтов у животных.

2.3 Препарат плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, из организма выделяется в основном в виде метаболитов с мочой и фекалиями.

2.4 Препарат не обладает эмбриотоксическим, сенсибилизирующим, тератогенным и кумулятивными свойствами, не раздражает кожу и слизистые оболочки.

2.5 Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 ФЕНБЕНДАФАРМ 22,5% назначают свиньям, крупному рогатому скоту, овцам, козам, лошадям, собакам и пушным зверям, прудовой рыбе.

Препарат применяют при диктиокаулезе, телязиозе, неоаскаридозе, желудочно-кишечных стронгилятозах, трихоцефалезе (трихурозе), стронгилоидозе, мониезиозе, параскаридозе, оксиурозе, аскариозе, оллуланозе, метастронгилезе, эзофагостомозе, токсаскариозе, токсокарозе, унцинариозе, цестодозах плотоядных, кавиозе, кариофиллезе, ботриоцефалезе, филометроидозе и смешанных цестодозах рыб.

3.2 ФЕНБЕНДАФАРМ 22,5% применяют однократно групповым способом с кормом без предварительной голодной диеты.

Показания и дозы приведены в таблице.

Таблица

Вид животного и название гельминтозов	Доза препарата, мг/кг (массы тела животного)
Крупный рогатый скот: - диктиокаулез, телязиоз, неоаскариоз, стронгилятозы желудочно-кишечного тракта, стронгилоидоз, трихоцефалез, эзофагостомоз, мониезиоз.	44
Свиньи: - аскариоз, трихоцефалез (трихуроз), эзофагостомоз, стронгилоидоз, метастронгилез, оллуланоз	22
Лошади: - параскариоз, стронгилоидоз, стронгилятозы желудочно-кишечного тракта - оксиуроз	44 67
Овцы: - субклиническое течение диктиокаулеза -клиническое течение диктиокаулеза, стронгилятозы желудочно-кишечного тракта, мониезиоз, трихоцефалез	22 44
Козы: - стронгилятозы желудочно-кишечного тракта, эзофагостомоз, стронгилоидоз	44
Собаки: - токсаскаридоз, токсокароз, унцинариоз, трихоцефалез, цестодозы	44
Пушные звери: - токсаскаридоз, токсокароз, унцинариоз, цестодозы	22
Прудовая рыба*: - кавиоз, кариофиллез, ботриоцефалез, филометроидоз и смешанные цестодозы	5,0 кг на 1 тонну комбикорма.

* Препарат применяют прудовой рыбе в виде лечебного гранулированного комбикорма. Лечебный комбикорм с ветеринарным препаратом «ФЕНБЕНДАФАРМ 22,5%» применяют согласно нормативам из расчета 5% лечебного корма от массы рыбы методом группового скармливания один раз в день два дня подряд. Контроль эффективности дегельминтизации осуществляется путем сопоставления инвазированности рыб до применения антгельминтика и через 7 дней после курса лечебного кормления. Вскрытию подвергают не менее 25 экз. сеголетков, 15-20 экз. двух- и трехлетков и 3-5 экз. рыб ремонтно-маточной группы. В случае обнаружения у рыб цестод курс лечения повторяют через 2 недели после предыдущего применения антгельминтика.

3.3 Обработку слабых и истощенных животных проводят индивидуально.

Перед массовыми обработками каждую серию препарата испытывают на небольшой группе животных (5 – 15) различного возраста и упитанности. Если в течение двух суток не отмечено признаков токсикоза, приступают к обработке всего поголовья.

3.4 Не применять животным с повышенной чувствительностью к препарату, беременным самкам в первую треть беременности, а также больным инфекционными заболеваниями животным.

3.5 Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток. Молоко от дойных животных можно использовать для пищевых целей через 5 суток после применения препарата. Реализация товарной рыбы проводится через 20 суток после последнего применения препарата.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать меры предосторожности и личной гигиены: пользоваться спецодеждой и резиновыми перчатками.

4.2 Запрещается во время работы принимать пищу, пить воду, курить.

4.3 После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр (220005, Республика Беларусь г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ» (ООО «ВЕТИНТЕРФАРМ»). Юридический адрес: 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. 91-29, район д. Большой Тростенец.

Адрес производственной площадки: 223070, Республика Беларусь, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

Адрес производственной площадки: 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 91/1, район д. Большой Тростенец).

Инструкцию по применению ветеринарного препарата «ФЕНБЕНДАФАРМ 22,5%» разработали: ведущий научный сотрудник отдела паразитологии «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» кандидат ветеринарных наук Т.Я. Мясцова, старший научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук С.И. Лавор и ООО «ВЕТИНТЕРФАРМ» (В.М. Романюк).