СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 63 от 26.08.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «ТИАДОКС-ФАРМ»

1. Торговое наименование.
ТИАДОКС-ФАРМ.

2. Международное непатентованное наименование.
Доксициклин, тиамулин.

3. Регистрационный номер.
8607-10-23 БА.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Порошок от светло-желтого до желтого цвета, растворимый в воде.

5. Состав.
В 1 г препарата содержится 200 мг доксициклина гиклата, 100 мг тиамулина гидрогенфумарата и наполнитель (декстроза моногидрат).

6. Фармакотерапевтическая группа.
Антибактериальные средства. Антибиотики тетрациклины в комбинациях.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Доксициклин - производное окситетрациклина.
Доксициклин активен в отношении грамположительных *(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathie, Clostridium spp.)* и грамотрицательных микроорганизмов *(Salmonella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Campylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Bordetella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp.)*, а также *Chlamydia spp., Rickettsia spp., Mycoplasma spp.*, *Borrelia spp*. и некоторых др.
Механизм действия связан с ингибированием синтеза белка путем обратимого связывания с 30S рибосомальной субъединицей чувствительных к препарату микроорганизмов и, тем самым, предотвращая связывание с их рибосомами аминоацилтранспортной РНК.
Доксициклин в терапевтических дозах действует на микробную клетку бактериостатически.
Тиамулин - полусинтетический антибиотик группы плевромутилинов. Активен в отношении микоплазм (*Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma hyosynoviae, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma meleagridis*), боррелий (*Borrelia hyodysenteriae*), многих грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий, в том числе *Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Arcanobacterium spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Clostridium perfringens, Lawsonia intracellularis, Pasteurella spp. (Mannheimia haemolitica), Leptospira spp., Haemophillus spp., Bacteroides spp.*
Механизм действия заключается в связывании тиамулина с 50S рибосомальной субъединицей чувствительных бактерий, что приводит к нарушению синтеза белков в бактериальной клетке.

Доксициклин хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта, связывается с белками плазмы крови (до 90 %) и проникают во все органы и ткани. Терапевтическая концентрация сохраняется в течение 18-24 ч.
Из организма доксициклин выводится преимущественно с фекалиями.
После перорального применения тиамулин также хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает во все органы и ткани организма. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 2 часа.
Тиамулин выводится из организма преимущественно с фекалиями и в незначительных количествах – с мочой.
Препарат согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к третьему классу опасности (вещества умеренно опасные).

8. Показания для применения.
ТИАДОКС-ФАРМ применяют свиньям с лечебной целью при дизентерии, инфекционном атрофическом рините, энзоотической пневмонии, актинобациллезной плевропневмонии, гемофилезном полисерозите, боррелиозе, сальмонеллезе, колибактериозе, илеите, некротическом энтерите и других болезнях, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к тиамулину и доксициклину.

9. Противопоказания.
Противопоказанием к применению препарата является выраженная функциональная недостаточность печени или почек, а также индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.
Запрещается использовать препарат с молоком и молочными продуктами.

10. Способ применения и дозы.
ТИАДОКС-ФАРМ применяют в смеси с кормом индивидуально или групповым способом в дозе 0,7 - 1 кг препарата на 1 т корма в сутки, или 30 - 45 мг/кг массы тела животного, в течение 5 дней.

11. Меры предосторожности при применении.
При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.
При существенном превышении рекомендуемых доз препарата при пероральном введении с кормом у свиней могут наблюдаться расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся в виде временного обильного слюнотечения (саливации), отказа от корма, тошноты, рвоты и диареи. Также возможно кратковременное угнетение центральной нервной системы (эффект седации/успокоения) и появление кожных реакций (эритема, зуд).

13. Беременность и период лактации.
Препарат противопоказан в период беременности и лактации.

14. Особые указания.
Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.
Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока применения препарата – следует применить его как можно быстрее, в той же дозе и по той же схеме.

15. Побочное действие.
В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений и осложнений. В редких случаях у свиней в начале лечения может развиться диарея, произойти отек тканей в области ануса и появиться покраснение кожи. Эти симптомы исчезают самостоятельно без прекращения лечения в течение 5 - 8 дней.
При длительном использовании препарата возможно развитие дисбактериоза и суперинфекции. В редких случаях при применении препарата возможны аллергические реакции. При наличии аллергических реакций препарат следует отменить, назначить антигистаминные средства и, при необходимости, симптоматические средства.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.
Не допускается одновременное применение препарата совместно с ионофорными антибиотиками (монензином, ласалоцидом, наразином, салиномицином и мадурамицином) в течение 7 дней до и 7 дней после применения лекарственного средства, а также с окислителями, антацидами, каолином и лекарственными средствами, содержащими железо, магний, кальций и алюминий. Запрещается использовать препарат с молоком и молочными продуктами.

17. Форма выпуска.
Пакеты из полимерных комбинированных материалов по 100, 500 г, 1 кг.
Мешки из бумаги и комбинированных материалов по 5, 10, 20 кг.

18. Срок годности.
Срок годности - 3 (три) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.
Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5°С до 25°С.
Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.
Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.
Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).
Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 20 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынуждено убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата.
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».
Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарного лекарственного препарата.
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Государственное учреждение
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР»

Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.
Адрес производства: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91/1, район д. Большой Тростенец.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».
Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.