СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 33 от 26.05.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «АМОКСИФАРМ ПЛЮС 12,5% ПОРОШОК»

1. Торговое наименование.
АМОКСИФАРМ ПЛЮС 12,5% ПОРОШОК.

2. Международное непатентованное наименование.
Амоксициллин (amoxicillin), клавулановая кислота (clavulanic acid).

3. Регистрационный номер.
8605-10-23 БА.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

5. Состав.
В 1 г препарата содержится 100 мг амоксициллина тригидрата, 25 мг клавулановой кислоты (в форме клавуланата калия) и наполнитель (декстроза моногидрат).

6. Фармакотерапевтическая группа.
Антибактериальные средства. Антибиотики-пенициллины в комбинациях.

7. Фармакодинамика и механизм действия.
Амоксициллин – полусинтетический антибиотик из группы пенициллина. Обладает широким спектром противомикробного действия. К амоксициллину чувствительны *Staphylococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Campylobacter spp., Salmonella spp., Escherichia coli, Haemophilus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum, Proteus spp.* и другие. Благодаря входящему в состав клавуланату калия препарат активен в отношении пенициллин-резистентных микроорганизмов.

Механизм действия амоксициллина заключается в нарушении синтеза клеточной стенки бактерии путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактерий.

Клавуланат калия является ингибитором β-лактамаз. Механизм действия заключается в конкурентном и необратимом связывании с β-лактамазами и с пенициллиназами. Присоединяясь к бактериальным ферментам, она образует стабильные, неактивные комплексы, предотвращая, таким образом, распад амоксициллина.

Амоксициллин и клавуланат калия хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта и быстро распределяется во всех органах и тканях организма.

Выделяются компоненты препарата в основном через почки с мочой и, в меньшей степени, с желчью.

Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.
АМОКСИФАРМ ПЛЮС 12,5% ПОРОШОК применяют крупному рогатому скоту, свиньям и сельскохозяйственной птице (ремонтный молодняк кур, цыплята-бройлеры и др.) для лечения болезней, вызванных микроорганизмами чувствительными к компонентам препарата (сальмонеллеза, эшерихиоза (колибактериоза), клостридиоза, стафилококкоза, рожи свиней и др.).

9. Противопоказания.

Не рекомендуется применять препарат животным, имеющим индивидуальную чувствительность к пенициллинам, при нарушении выделительной функции почек.

Препарат запрещен птице, чье яйцо используется в пищу людям.

10. Способ применения и дозы.

АМОКСИФАРМ ПЛЮС 12,5% ПОРОШОК применяют сельскохозяйственной птице с питьевой водой в течение 3-5 дней в следующих дозах:

- цыплятам до 10-дневного возраста: 100 г препарата на 400 л воды, при индивидуальной даче 0,01 г на кг массы тела цыплят;
- птице старше 10-дневного возраста: 100 г препарата на 200 л воды, при индивидуальной даче 0,02 г на кг массы тела птицы.

Раствор готовят из расчета потребности птицы в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

Свиньям препарат применяют в дозе 4 – 10 г на 100 кг (0,4 – 1 г / 10 кг) массы тела 2 раза в сутки в течение 3 – 5 дней с кормом, водой или молоком.

Крупному рогатому скоту (телята, молодняк крупного рогатого скота) препарат применяют в дозе 0,4 г / 10 кг массы тела один - два раза в сутки в зависимости от тяжести болезни в течение 3 – 5 дней с кормом, водой или молоком.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.

При применении препарата возможны аллергические реакции. При наличии побочных эффектов применение препарата прекращают, назначают антигистаминные препараты и препараты кальция.

13. Беременность и период лактации.

Препарат противопоказан в период беременности и лактации.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока применения препарата – следует применить его как можно быстрее, в той же дозе и по той же схеме.

15. Побочное действие.

При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Запрещается совместное применение препарата с антибиотиками групп тетрациклина, амфениколами, макролидами и линкозамидами; сульфаниламидами.

17. Форма выпуска.

Пакеты из полимерных комбинированных материалов по 100, 500 г, 1 кг.

18. Срок годности.

Срок годности - 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°С до 25°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Убой птицы на мясо разрешается через 5 суток, свиней и крупного рогатого скота через 15 суток после прекращения применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарных лекарственных

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

Адрес производства: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91/1, район д. Большой Тростенец.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.