СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 25 от 13.04.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «ДОКСИФАРМ 200»

1 Общие сведения

1.1 ДОКСИФАРМ 200 (DOXYPHARMUM 200).

Международное непатентованное наименование активной фармацевтической субстанции: доксициклин.

1.2 ДОКСИФАРМ 200 представляет собой порошок от светло-желтого до желтого цвета, растворимый в воде.

В 1 г препарата содержится 200 мг доксициклина гиклата и наполнитель (декстрозы моногидрат).

Лекарственная форма: порошок для приема внутрь.

1.3 ДОКСИФАРМ 200 выпускают в пакетах из полимерных комбинированных материалов по 100 г, 500 г и 1 кг; мешках из бумаги и комбинированных материалов по 3 кг, 5 кг, 10 кг и 20 кг.

1.4 Препарат хранят в упаковке изготовителя, в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5°С до 25°С.

1.5 Срок годности 3 (три) года от даты производства, при условии соблюдения правил хранения и транспортирования. Не применять по истечении срока годности. Хранить в недоступном для детей месте. Ветеринарный лекарственный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.6 Условия отпуска: отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

2 Фармакологические свойства

2.1 ДОКСИФАРМ 200 относится к клинико-фармакологической группе – антибактериальные средства, антибиотики тетрациклины.

2.2 Доксициклин - производное окситетрациклина. Активен в отношении грамположительных *(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathie, Clostridium spp.)* и грамотрицательных микроорганизмов *(Salmonella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Campylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Bordetella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus pleuropneumoniae)*, а также *Leptospira spp., Chlamydia spp., Rickettsia spp., Mycoplasma spp., Brachyspira hyodysenteriae, Borrelia spp.*

2.3 Доксициклин в терапевтических дозах действует на микробную клетку бактериостатически.

Механизм действия связан с ингибированием синтеза белка путем обратимого связывания с 30S рибосомальной субъединицей чувствительных к препарату микроорганизмов и тем самым предотвращая связывание с их рибосомами аминоацилтранспортной РНК.

2.4 Препарат хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, связывается с белками плазмы крови (до 90 %) и проникает во все органы и ткани, проходит через плацентарный барьер. Терапевтическая концентрация сохраняется в течение 18-24 ч.

Из организма препарат выводится преимущественно с фекалиями, у птиц с яйцом.

2.5 ДОКСИФАРМ 200 по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

3 Порядок применения

3.1 ДОКСИФАРМ 200 применяют свиньям при энзоотической пневмонии, плевропневмонии, атрофическом рините, сальмонеллезе, колибактериозе, дизентерии, лептоспирозе; молодняку крупного рогатого скота при сальмонеллезе, колибактериозе, стафилококкозе,

стрептококкозе; сельскохозяйственной птице (цыплята-бройлеры, ремонтный молодняк кур-несушек) при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к доксициклину.

3.2 ДОКСИФАРМ 200 применяют внутрь в следующих дозах:

- свиньям: в первый день 100 – 150 мг/кг массы тела, а в последующие дни 50 – 75 мг/кг массы тела один раз в сутки в течение 3 - 5 дней с кормом или водой. При групповой даче препарат смешивают с кормом из расчета 1 кг препарата на тонну корма или воды. Полученную смесь скармливают или выпаивают в течение 3 – 7 дней в зависимости от тяжести заболевания;

- телятам: в первый день 75 – 100 мг/кг массы тела два раза, а в последующие дни в дозе 40 – 50 мг/кг массы один раз в сутки до выздоровления с кормом или водой;

- сельскохозяйственной птице: с питьевой водой из расчета 500 г препарата на 1000 л питьевой воды в течение 3 – 5 дней или 0,05 – 0,07 г на 1 кг массы тела.

Раствор готовят из расчета потребности птицы в воде на одни сутки. Допускается готовить раствор на 6 – 8 часов. В последующем птица должна быть обеспечена чистой водой (без препарата).

3.3 При длительном применении возможна кумуляция препарата. Доксициклин противопоказан животным с повышенной чувствительностью к нему.

Не следует применять препарат свиньям во второй половине супоросности. Запрещается использовать для лечения лошадей, кошек и собак, жвачным животным старше 6-месячного возраста.

Запрещается применение препарата животным с тяжелыми нарушениями функций печени и почек.

3.4 Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп пенициллина и цефалоспорина, средствами, содержащими соединения кальция, алюминия и магния. Запрещается использовать препарат с молоком и молочными продуктами.

3.5 В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений и осложнений. В редких случаях возможны аллергические реакции. При появлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить антигистаминные средства, препараты кальция и, при необходимости, симптоматические средства.

3.6 Применение препарата прекращают за 20 дней до начала яйцекладки. Запрещается применение препарата птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

3.7 Убой животных и птиц на мясо разрешается не ранее, чем через 20 суток после последнего применения препарата. Мясо животных и птицы, вынуждено убитой до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

4 Меры профилактики

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6 Полное наименование производителя

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ» (ООО «ВЕТИНТЕРФАРМ»). Юридический адрес: 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. 91-29, район д. Большой Тростенец.

Адрес производственной площадки: 223070, Республика Беларусь, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

Адрес производственной площадки: 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 91/1, район д. Большой Тростенец).

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедры фармакологии и токсикологии (Ятусевич И.А., Т.Н. Смаглей), внутренних незаразных болезней (В.Н. Иванов), паразитологии и инвазионных болезней (И.П. Захарченко) УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и ООО «ВЕТИНТЕРФАРМ» (В.М. Романюк).