СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 33 от 26.05.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «ДОКСИФАРМ»

1. Торговое наименование.
ДОКСИФАРМ.

2. Международное непатентованное наименование.
Доксициклин (doxycycline), аскорбиновая кислота (ascorbic acid).

3. Регистрационный номер.
7338-10-20 БА.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Препарат представляет собой порошок желтого цвета со слабым специфическим запахом, легко растворим в воде.

5. Состав.
В 1 г препарата содержится доксициклина гиклата (гидрохлорида) 100 мг; аскорбиновой кислоты 80 мг; наполнитель (декстроза моногидрат).

6. Фармакотерапевтическая группа.
Антибактериальные средства. Антибиотики тетрациклины в комбинациях.

7. Фармакодинамика и механизм действия.
Доксициклин обладает выраженным бактериостатическим действием в отношении грамположительных *(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathie, Clostridium spp.)* и грамотрицательных микроорганизмов *(Salmonella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Campylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Bordetella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Brucella spp.)*, а также *Chlamydia spp., Rickettsia spp., Mycoplasma spp.* и *Borrelia spp.*
В терапевтических дозах действует на микробную клетку бактериостатически, ингибируя синтез белков путем обратимого связывания с 30S рибосомальной субъединицей чувствительных к препарату микроорганизмов, и тем самым предотвращая связывание с их рибосомами аминоацилтранспортной РНК.
Аскорбиновая кислота (витамин С) повышает общую резистентность организма, участвует в окислительно-восстановительных процессах, метаболизме многих веществ в организме (фолиевой кислоты, фенилаланина, тирозина и др.), улучшает всасываемость железа из желудочно-кишечного тракта.
Доксициклин хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, быстро распределяется в большинстве органов и тканей организма. Эффективная концентрация в крови достигается через 2-4 часа и удерживается в течение 18-24 часов. Доксициклин выводится из организма в основном в неизменном виде с фекалиями и мочой.
Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.

ДОКСИФАРМ применяют для лечения свиней при актинобацилярной пневмонии, атрофическом рините, сальмонеллезе, колибактериозе, дизентерии, лептоспирозе и некоторых других патологиях; крупного рогатого скота (молодняка) при сальмонеллезе, колибактериозе, стафилококкозе, стрептококкозе и других болезнях, возбудители которых чувствительны к доксициклину; сельскохозяйственной птицы при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе, смешанных инфекциях, инфекциях невыясненной этиологии, а также при бактериальных осложнениях вирусных инфекций.

9. Противопоказания.

Не применять при повышенной индивидуальной чувствительности животных к компонентам препарата.

10. Способ применения и дозы.

При применении свиньям препарат смешивают с кормом из расчета 2 кг препарата на тонну корма. Полученную смесь скармливают в течение 5 – 10 дней до выздоровления.

При индивидуальной даче препарат применяют в дозе в первый день 20 – 30 мг/кг массы (по АДВ) или 0,2 – 0,3 г/кг (по препарату), а в последующие дни в дозе 10– 15 мг/кг (по АДВ) или 0,1 – 0,15 г/кг (по препарату) один раз в сутки до выздоровления.

Телятам препарат применяют орально с питьевой водой или кормом в дозе в первый день 15 – 20 мг/кг массы (по АДВ) или 0,15 – 0,2 г/кг (по препарату) два раза, а в последующие дни в дозе 7,5 – 10мг/кг (по АДВ) или 0,075 – 0,1 г/кг (по препарату) один раз в сутки до выздоровления.

Птице препарат применяют орально с питьевой водой из расчета 1000 г препарата на 1000 л воды в течение 3 - 5 дней. Раствор готовят из расчета потребности птицы в воде на 6 – 8 ч. В последующем птица должна быть обеспечена чистой водой (без препарата).

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности. Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты.

12. Передозировка.

Передозировка часто проявляется рвотой, диареей и потерей аппетита.

При длительном применении возможна кумуляция препарата.

13. Беременность и период лактации.

Не следует применять препарат на последних этапах беременности.

14. Особые указания.

Применение препарата птице прекращают за 20 дней до начала яйцекладки. Запрещается применение препарата птице, чьё яйцо используется в пищу людям.

После применения препарата следует защищать животных от прямого солнечного света, ввиду того, что антибиотик может повышать фоточувствительность кожи.

15. Побочное действие.

При пероральном применении доксициклина возможны побочные действия, у собак и кошек может появиться тошнота и рвота. Для того, чтобы частично снять эти эффекты, препарат следует дать с кормом, что не уменьшает его абсорбции. В случае появления симптомов аллергической реакции применение препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты, препараты кальция и средства симптоматической терапии.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Не допускается применение препарата совместно с пенициллинами, цефалоспоринами, хинолонами, молоком и молочными продуктами, минеральными добавками и препаратами, содержащими железо, магний, кальций из-за снижения антибактериальной активности.

17. Форма выпуска.

Препарат выпускают в пакетах из полимерных комбинированных материалов по 100 г, 500 г, 1 кг и мешках из бумаги из комбинированных материалов по 3, 5, 10, 20 и 25 кг.

18. Срок годности.

Срок годности - 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 10°С до 30°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Убой животных и птиц на мясо разрешается не ранее, чем через 21 сутки после последнего применения препарата. Мясо животных и птицы, вынуждено убитой до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарных лекарственных

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.