СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 63 от 26.08.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «ДОКСИФАРМ 500»

1. Торговое наименование.
ДОКСИФАРМ 500.

2. Международное непатентованное наименование.
Доксициклин.

3. Регистрационный номер.
6793-10-19 БА.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Порошок от светло-желтого до желтого цвета, легкорастворимый в воде.

5. Состав.
В 1 г препарата содержится 500 мг доксициклина гиклата и наполнитель (декстроза моногидрат).

6. Фармакотерапевтическая группа.
Антибактериальные средства. Антибиотики тетрациклины.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Доксициклин – полусинтетический антибиотик тетрациклинового ряда.
Обладает выраженным действием в отношении грамположительных *(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathie, Clostridium spp.)* и грамотрицательных микроорганизмов *(Salmonella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Campylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Bordetella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Brucella spp.)*, а также *Chlamydia spp., Rickettsia spp., Mycoplasma spp.* и *Borrelia spp.*
В терапевтических дозах действует на микробную клетку бактериостатически, ингибируя синтез белков путем обратимого связывания с 30S рибосомальной субъединицей чувствительных к препарату микроорганизмов, и тем самым предотвращая связывание с их рибосомами аминоацилтранспортной РНК.
Доксициклин хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, быстро распределяется в большинстве органов и тканей организма. Эффективная концентрация в крови достигается через 2-4 часа и удерживается в течение 18-24 часов. Доксициклин выводится из организма в основном в неизменном виде с фекалиями и мочой.
Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.
ДОКСИФАРМ 500 применяют для лечения свиней при энзоотической пневмонии, плевропневмонии, атрофическом рините, сальмонеллезе, колибактериозе, дизентерии и лептоспирозе; сельскохозяйственной птицы при респираторных и желудочно-кишечных болезнях бактериальной этиологии, включая колибактериоз, пастереллез, сальмонеллез, микоплазмоз, стафилококкоз и смешанные инфекции; телят, ягнят и козлят при

сальмонеллезе, колибактериозе, стафилококкозе, стрептококкозе, а также при других болезнях, возбудители которых чувствительны к доксициклину, в том числе при бактериальных осложнениях вирусных инфекций.

9. Противопоказания.
Препарат запрещен к применению для всех видов животных (в период лактации или яйценоскости), молоко или яйца которых предназначены в пищу людям.

10. Способ применения и дозы.
ДОКСИФАРМ 500 применяют в следующих дозах:
- свиньям: 20-40 мг/кг массы тела или 100 - 200 г препарата на 1000 л питьевой воды или 1 т корма в течение 3 - 5 дней;
- сельскохозяйственной птице (цыплята-бройлеры, ремонтный молодняк кур-несушек, гусята, индейки): 20-40 мг/кг массы тела или 100 - 200 г препарата на 1000 л питьевой воды или 1 т корма в течение 3-5 дней. В период лечения птица должна получать воду, содержащую только препарат. Приготовленный раствор препарата необходимо использовать в течение 24 ч.
- телятам, ягнятам, козлятам: 0,03 – 0,04 г/кг массы тела (15 – 20 мг/кг массы по АДВ) с питьевой водой или кормом в первый день два раза в сутки, а в последующие дни в дозе 0,15 – 0,2 г/ 10 кг массы тела (по препарату) (7,5 – 10 мг/кг по АДВ) один раз в сутки или 0,1 г/10 кг массы тела два раза в день в течение 3 – 5 дней.

11. Меры предосторожности при применении.
При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.
При передозировке препарата у животных может наблюдаться на рушение функции желудочно-кишечного тракта (диарея, тошнота, рвота), снижение потребления корма.

13. Беременность и период лактации.
Препарат противопоказан в период беременности и лактации.

14. Особые указания.
Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.
Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока применения препарата – следует применить его как можно быстрее, в той же дозе и по той же схеме.

15. Побочное действие.
При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.
В редких случаях возможны аллергические реакции. При наличии побочных явлений препарат следует отменить и назначить антигистаминные препараты и, при необходимости, симптоматические средства.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.
Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп пенициллинов, полимиксина и препаратами, содержащими соединения кальция, алюминия и магния. Запрещается использовать препарат с молоком и молочными продуктами.

17. Форма выпуска.
Пакеты из полимерных комбинированных материалов по 100, 500 г, 1 кг.
Мешки из бумаги и комбинированных материалов по 3, 5, 10, 20, 25 кг.

18. Срок годности.
Срок годности - 3 (три) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.
Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5°С до 25°С.
Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.
Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.
Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).
Убой животных, птиц на мясо разрешается через 20 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата.
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».
Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарного лекарственного препарата.
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».
Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.
Адрес производства: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91/1, район д. Большой Тростенец.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».
Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Государственное учреждение
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР»