СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 15 от 10.03.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «КИТАФАРМ»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 КИТАФАРМ (KITAPHARMUM).

Международное непатентованное наименование активных фармацевтических субстанций: китасамицин, триметоприм, сульфадимезин, парацетамол, аскорбиновая кислота.

1.2 КИТАФАРМ представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом.

Лекарственная форма: порошок для приема внутрь.

В 1 г препарата содержится китасамицина - 30,0 мг; триметоприма - 45,0 мг; сульфадимезина (сульфадимидина) натрия - 160,0 мг; парацетамола - 40,0 мг; аскорбиновой кислоты - 25,0 мг и наполнитель (декстроза моногидрат).

1.3 КИТАФАРМ выпускают в пакетах из полимерных комбинированных материалов по 100, 200, 500 г, 1 кг и мешках из бумаги и комбинированных материалов по 3, 5, 10, 20 и 25 кг.

1.4 КИТАФАРМ хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С.

Срок годности 2 (два) года от даты производства при условии соблюдения правил хранения и транспортирования. Не применять по истечении срока годности. Хранить в недоступном для детей месте. Ветеринарный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.5 Условия отпуска: отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 КИТАФАРМ – комплексный противомикробный препарат, относящийся к клинико-фармакологической группе антибиотики макролиды в комбинациях.

КИТАФАРМ обладает широким спектром противомикробного действия. Активен в отношении грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов (*Streptococcus spp., Staphylococcus spp.* (в том числе, продуцирующих пенициллиназу), *Clostridium spp., Corynebacterium spp., Listeria monocytogenes, Haemophillus spp. и* др.), а также *Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Rickettsia* и др.

2.2 Китасамицин - антибиотик группы макролидов, механизм действия которого связан с угнетением синтеза белка рибосомами бактерий.

Сульфадиазин относится к группе сульфаниламидов, являясь конкурентом парааминобензойной кислоты, тормозит синтез функциональной фолиевой кислоты.

Триметоприм относится к группе диаминопиримидинов, блокирует фермент дигидрофолат-редуктазу, который активирует фолиевую кислоту. Триметоприм и сульфадимезин усиливают противомикробное действие препарата. При комбинированном действии сульфадимезина и триметоприма на бактериальную клетку нарушается синтез фолиевой кислоты на двух последовательных стадиях, что приводит к блокированию синтеза нуклеотидов и обуславливает синергидное бактерицидное действие этой комбинации.

Парацетамол обладает анальгетическим, противовоспалительным и жаропонижающим действием. Механизм его действия связан с ингибированием синтеза простагландинов, с преимущественным влиянием на центр терморегуляции в гипоталамусе.

Аскорбиновая кислота обладает антистрессовым действием и повышает общую резистентность организма.

2.3 Компоненты препарата сравнительно быстро всасываются из желудочно-кишечного тракта и создают высокие концентрации в крови, органах и тканях животных.

Максимальная концентрация препарата в крови отмечается через 6-8 ч, а терапевтический уровень удерживается в течение 8-12 ч.

Из организма компоненты препарата выводятся в основном с мочой.

2.4 Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 КИТАФАРМ применяют для лечения молодняка крупного рогатого скота, свиней, сельскохозяйственной птицы (ремонтного молодняка кур, цыплят-бройлеров и др.) при респираторных заболеваниях, колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к компонентам препарата.

3.2 КИТАФАРМ применяют внутрь в следующих дозах:

- сельскохозяйственной птице: 1-2 кг на одну тонну корма в течение 3-5 дней;
- свиньям: 1-2 кг на одну тонну корма или воды в течение 5 дней;
- телятам: 1-3 г препарата на 10 кг массы тела 2-3 раза в сутки в течение 5-7 дней.

3.3 КИТАФАРМ применяют с питьевой водой, молоком или в смеси с кормом. Для равномерного распределения препарата рекомендуется применять дробное смешивание с комбикормом (полученную смесь необходимо использовать в течение 14 дней).

Полученный раствор препарата необходимо использовать в течение 24 часов.

3.4 Не рекомендуется применять препарат животным и птице, имеющим индивидуальную чувствительность к компонентам препарата, животным с развитым рубцовым пищеварением, дойным животным и в сочетании с препаратами, являющимися производными парааминобензойной кислоты.

Противопоказано совместное применение препарата с пенициллинами и цефалоспоринами.

3.5 В случае возникновения аллергических реакций препарат следует отменить и назначить противогистаминные препараты и препараты кальция.

3.6 Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее чем через 15 суток после последнего применения препарата.

Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, используют для кормления плотоядных животных

Препарат запрещен к применению птице, чье яйцо используется в пищу людям.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ» (ООО «ВЕТИНТЕРФАРМ»). Юридический адрес: 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. 91-29, район д. Большой Тростенец.

Адрес производственной площадки: 223070, Республика Беларусь, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

Адрес производственной площадки: 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 91/1, район д. Большой Тростенец).

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедр фармакологии и токсикологии (И.А. Ятусевич, В.В. Петров), внутренних незаразных болезней животных (В.Н. Иванов) УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и ООО «ВЕТИНТЕРФАРМ» (В.М. Романюк).