СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 33 от 26.05.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «ПАРАЦЕТАМОКС»

1. Торговое наименование.
ПАРАЦЕТАМОКС.

2. Международное непатентованное наименование.
Амоксициллин, парацетамол.

3. Регистрационный номер.
8456-10-23 БА.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Порошок от белого до светло-желтого цвета.

5. Состав.
В 1 г препарата в качестве действующих веществ содержится амоксициллина тригидрат – 200 мг, парацетомол – 100 мг, вспомогательное вещество – декстроза моногидрат.

6. Фармакотерапевтическая группа.
Антибактериальные средства. Антибиотики-пенициллины в комбинациях.

7. Фармакодинамика и механизм действия.
Амоксициллин – полусинтетический антибиотик из группы пенициллина, обладает широким спектром противомикробного действия. К амоксициллину чувствительны *Staphylococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Campylobacter spp., Salmonella spp., Escherichia coli, Haemophilus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum, Proteus spp.* и другие.
Механизм действия амоксициллина заключается в нарушении синтеза клеточной стенки бактерий путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактерий.
Амоксициллин хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и быстро распределяется во всех органах и тканях организма. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1 – 2 часа после применения препарата и сохраняется на терапевтическом уровне в течение до 12 часов.
Выделяется амоксициллин в основном с мочой и, в меньшей степени, с желчью.
Парацетамол обладает анальгизирующим и жаропонижающим действием. Хорошо всасывается из кишечника и быстро распределяется в большинстве тканей. Приблизительно на 25% связывается с белками плазмы крови. Механизм действия связан со способностью угнетать синтез простогландинов путем блокирования циклооксигеназ.
Период полувыведения 1 – 4 часа, выделяется почками в виде метаболитов и в небольшой степени в неизменённом виде.
Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.

ПАРАЦЕТАМОКС применяют молодняку крупного рогатого скота и свиней для лечения эшерихиоза (колибактериоза), сальмонеллеза, стафилококкоза, стрептококкоза, псевдомоноза и других болезней, вызванных микроорганизмами чувствительными к амоксициллину.

9. Противопоказания.

Не рекомендуется применять препарат животным, имеющим индивидуальную чувствительность к пенициллинам и цефалоспоринам, при нарушении выделительной функции почек.

10. Способ применения и дозы.

ПАРАЦЕТАМОКС применяют телятам и поросятам 2 раза в сутки орально в смеси с кормом, водой или молоком в дозе 0,5 – 1,0 г на 10 кг массы тела в течение 3 – 7 дней.

Полученный раствор необходимо использовать в течение 24 часов.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности. Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты.

12. Передозировка.

Значительная передозировка препарата может вызвать гепатотоксическое действие, которое сопровождается сонливостью, бледностью кожного покрова и видимых слизистых оболочек, рвотой.

В этом случае следует провести дезинтоксикационное и симптоматическое лечение.

В качестве антидота используют N-ацетил цистеин.

13. Беременность и период лактации.

Беременным животным препарат назначают с осторожностью (под наблюдением ветеринарного врача).

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

15. Побочное действие.

При применении препарата возможны аллергические реакции (кожная сыпь, эритема, зуд), у поросят - отек тканей в области прямой кишки; при длительном применении – дисбактериоз; в редких случаях нейротоксическое действие.

При наличии побочных эффектов применение препарата прекращают, назначают антигистаминные препараты и препараты кальция, и, при необходимости, симптоматические средства.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Не следует применять препарат одновременно с рифампицином, барбитуратами, с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол, так как это может привести к взаимному усилению гепатотоксического эффекта и снижению жаропонижающего действия препарата, а также, во избежание передозировки, совместно с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол.

17. Форма выпуска.

Препарат выпускают в пакетах из полимерных комбинированных материалов по 100, 200, 500 г, 1 кг и мешках из бумаги и комбинированных материалов по 3, 5, 10, 20 и 25 кг.

18. Срок годности.

Срок годности - 2 (два) года от даты производства при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Срок годности препарата после первого вскрытия упаковки – 30 суток.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°С до 25°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Убой животных на мясо разрешается через 15 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарных лекарственных

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

Адрес производства: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91/1, район д. Большой Тростенец.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.