СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 33 от 26.05.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «ПОЛИВЕТ»

1. Торговое наименование.
ПОЛИВЕТ.

2. Международное непатентованное наименование.
Калия хлорид (potassium chloride), натрия хлорид (sodium chloride), натрия гидрокарбонат (sodium bicarbonate).

3. Регистрационный номер.
7097-10-20 БПХ-Ф.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Препарат представляет собой комплект-упаковку, состоящую из двух пакетов.

5. Состав.
В пакет № 1 входят: калия хлорид - 70 г, натрия хлорид - 30 г, натрия гидрокарбонат - 50 г. Представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета.
В пакет № 2 входит декстроза/глюкоза. Представляет собой белый или слегка желтоватый кристаллический порошок.

6. Фармакотерапевтическая группа.
Регидратационные средства.

7. Фармакодинамика и механизм действия.
ПОЛИВЕТ восстанавливает водно-электролитный баланс организма животного, нарушенный при обезвоживании.
Действие препарата основано на том, что натрия гидрокарбонат устраняет ацидоз, калия хлорид обеспечивает нормализацию деятельности сердца и гладкой мускулатуры кишечника, а глюкоза способствует обратному поступлению натрия из кишечника, вместе с которой всасывается и вода.
Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.
ПОЛИВЕТ применяют в качестве регидратационного средства при желудочно-кишечных болезнях телят, сопровождающихся диарейным синдромом.

9. Противопоказания.
Противопоказаний к применению препарата не имеется.

10. Способ применения и дозы.

Перед применением содержимое двух пакетов (№ 1 и № 2) растворяют в 20 л кипяченой воды (охлажденной до 35-37°С) в эмалированной, глиняной или полиэтиленовой посуде.

Приготовленный раствор можно хранить в холодильнике при температуре +4°С не более 24 ч.

3.3 Препарат применяют телятам путем выпойки раствора из сосковых поилок, а при нарушении сосательного рефлекса раствор вводят через желудочный зонд.

Лечение животных проводят в два этапа.

1 этап – первичная регидратация. В зависимости от тяжести заболевания и степени обезвоживания раствор препарата дают однократно в дозах 50 $см^3$/кг массы животного – при легких формах болезни, 80 $см^3$/кг – при среднетяжелых и 100 $см^3$/кг – при тяжелых формах. Дачу молока (молозива) уменьшают в два раза.

2 этап – продолжают регидратационную терапию в зависимости от состояния больного животного в дозе 25-50 $см^3$/кг массы животного 2-3 раза в день, до прекращения диареи.

Молоко (молозиво) назначают по общепринятой схеме.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности. Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты.

12. Передозировка.

При передозировке препарата у животных может наблюдаться на рушение функции желудочно-кишечного тракта, снижение потребления корма.

13. Беременность и период лактации.

Особенностей действия препарата на беременных и лактирующих животных, а также на их потомство не выявлено.

14. Особые указания.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

15. Побочное действие.

ПОЛИВЕТ при применении животным не оказывает побочного действия и не вызывает осложнений.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Применение препарата не исключает возможности применения других химиотерапевтических средств.

17. Форма выпуска.

Препарат выпускают по 550 г (масса пакета № 1 - 150 г; масса пакета № 2 - 400 г).

Пакеты № 1 и № 2 (из полимерных комбинированных материалов) помещают в полимерную тару (банки).

18. Срок годности.

Срок годности - 3 (три) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0°С до 25°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.

Без рецепта ветеринарного врача.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

При применении препарата убой животных на мясо разрешен без ограничений.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарных лекарственных

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.