СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 69 от 26.08.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «СУЛЬФАДОКС-ФАРМ»

1. Торговое наименование.
СУЛЬФАДОКС-ФАРМ.

2. Международное непатентованное наименование.
Доксициклин, сульфадимезин.

3. Регистрационный номер.
8555-10-23 БА.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Порошок от светло-желтого до желтого цвета, растворимый в воде.

5. Состав.
В 1 г препарата содержится 150 мг доксициклина гиклата, 350 мг сульфадимезина и наполнитель (декстрозы моногидрат).

6. Фармакотерапевтическая группа.
Антибактериальные средства. Антибиотики. Тетрациклины в комбинациях.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Доксициклин - производное окситетрациклина. Механизм действия связан с ингибированием синтеза белка путем обратимого связывания с 30S рибосомальной субъединицей чувствительных к препарату микроорганизмов, тем самым предотвращая связывание с их рибосомами аминоацилтранспортной РНК.

Доксициклин в терапевтических дозах действует на микробную клетку бактериостатически.

Сульфадимезин относится к сульфаниламидным средствам. Механизм действия обусловлен угнетением фермента дигидроптероатсинтетазы, в результате чего нарушается синтез фолиевой кислоты посредством конкурентного замещения парааминобензойной кислотой.

Препарат активен в отношении грамположительных *(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathie, Clostridium spp.)* и грамотрицательных микроорганизмов *(Salmonella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Campylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Bordetella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp.)*, а также *Chlamydia spp., Rickettsia spp., Mycoplasma spp., Borrelia spp., Eimeria spp., Haemophilus spp., Toxoplasma* и др.

Компоненты препарата хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта, связываются с белками плазмы крови (до 90 %) и проникают во все органы и ткани. Терапевтическая концентрация сохраняется в течение 18-24 ч.

Из организма доксициклин выводится преимущественно с фекалиями, у птиц с яйцом; сульфадимезин - через почки с мочой.

СУЛЬФАДОКС-ФАРМ по параметрам острой оральной токсичности по классификации ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу опасности (вещества умеренно опасные).

8. Показания для применения.
СУЛЬФАДОКС-ФАРМ применяют свиньям при энзоотической пневмонии, плевропневмонии, атрофическом рините, сальмонеллезе, эшерихиозе (колибактериозе), дизентерии,

лептоспирозе, эймериозе; молодняку крупного рогатого скота при сальмонеллезе, колибактериозе, стафилококкозе, стрептококкозе, эймериозе; сельскохозяйственной птице (цыплята-бройлеры, ремонтный молодняк кур-несушек) при эшерихиозе (колибактериозе), пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе и других болезнях, сопровождающихся нарушением функции желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы, возбудители которых чувствительны к доксициклину и сульфадимезину.

9. Противопоказания.

Не следует применять препарат свиньям во второй половине супоросности. Запрещается использовать для лечения лошадей, кошек и собак, жвачным животным старше 6-месячного возраста.

Запрещается применение препарата животным с тяжелыми нарушениями функций печени и почек.

Запрещается использовать препарат с молоком и молочными продуктами.

Запрещается применение препарата птице, чьё яйцо используется в пищу людям, ремонтному молодняку кур позднее 20 дней до начала яйцекладки.

10. Способ применения и дозы.

СУЛЬФАДОКС-ФАРМ применяют внутрь в следующих дозах:

- сельскохозяйственной птице: 400 – 500 г препарата на 1000 л питьевой воды (при групповой даче) или 0,04 – 0,06 г на 1 кг массы тела (при индивидуальной даче) в сутки. Продолжительность курса лечения 3-4 дня; при смешанных инфекциях, а также хроническом течении болезни - 5 дней. Птице раствор препарата готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. В период лечения птица должна получать воду содержащую только препарат. При необходимости курс лечения повторяют через 5 дней;
- свиньям: 500 – 1000 г препарата на 1000 л питьевой воды или 700 – 1000 г на 1 т корма в сутки (при групповой даче) или 0,4 – 0,6 г на 10 кг массы тела в сутки при индивидуальной даче в течение 3-5 дней;
- телятам до 6-месячного возраста с кормом или питьевой водой из расчета 0,4 – 0,6 г на 10 кг массы животного один раз в сутки в течение 3 – 5 дней.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.

В редких случаях при применении препарата возможны аллергические реакции, а у животных с нарушениями выделительной функции почек – нефро- и нейротоксические реакции.

13. Беременность и период лактации.

Препарат противопоказан в период беременности и лактации.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока применения препарата – следует применить его как можно быстрее, в той же дозе и по той же схеме.

15. Побочное действие.

В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений и осложнений.

При наличии побочных эффектов препарат следует отменить, назначить антигистаминные средства и, при необходимости, симптоматические средства.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов, пенициллина, другими антибиотиками из групп тетрациклина и полимиксина, амфениколами, нестероидными противовоспалительными средствами и препаратами, содержащими соединения железа, кальция, алюминия и магния.

17. Форма выпуска.

Пакеты из полимерных комбинированных материалов по 100, 500 г, 1 кг.

Мешки из бумаги и комбинированных материалов по 5, 10, 20 кг.

18. Срок годности.

Срок годности - 3 (три) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5°С до 25°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Убой животных и птиц на мясо разрешается не ранее, чем через 20 суток после последнего применения препарата. Мясо животных и птицы, вынуждено убитой до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

Адрес производства: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91/1, район д. Большой Тростенец.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Государственное учреждение
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР»