СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 63 от 26.08.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «ТЕТРАМИФАРМ 20%»

1. Торговое наименование.
ТЕТРАМИФАРМ 20%.

2. Международное непатентованное наименование.
Тетрамизол.

3. Регистрационный номер.
8837-10-24 БСПА.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Порошок от белого до кремового цвета.

5. Состав.
В 1 г препарата содержится 200 мг тетрамизола гидрохлорида и наполнитель (декстроза моногидрат).

6. Фармакотерапевтическая группа.
Антигельминтик.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Действующее вещество - тетрамизола гидрохлорид (DL-2,3,5,6,-тетрагидро-6-фенил-имидазо-(2,1-b) тиазол-гидрохлорид).
Тетрамизол является антигельминтиком нематоцидного действия (взрослых и личиночных форм нематод). Активен в отношении нематод, локализующихся в желудочно-кишечном тракте, легких, и других органах и тканях организма животных *(Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Cooperia spp., Dictyocaulus spp., Strongyloides papillosus, паразитирующих у жвачных животных; Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Metastrongylus spp., Oesophagostomum spp., паразитирующих у свиней; Philometroides lusiana, Anguillicola crassus - у рыб).*
Механизм действия препарата основан на воздействии тетрамизола гидрохлорида на нервно-мышечную систему и угнетении активности ферментных систем паразита, что приводит к нарушению углеводного обмена, к его параличу и выведению из организма животного.
После перорального введения тетрамизола гидрохлорид быстро реабсорбируется, максимальная концентрация препарата достигается в органах и тканях через 30 минут и сохраняется на терапевтическом уровне в течение 6-9 часов. Выводится тетрамизола гидрохлорид из организма с мочой в течение трех дней.
Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.
ТЕТРАМИФАРМ 20% применяют:

- свиньям при аскариозе, стронгилоидозе, трихоцефалезе, эзофагостомозе, метастронгилезе, оллуланозе;
- крупному и мелкому рогатому скоту при диктиокаулезе, желудочно-кишечных стронгилятозах, телязиозе, буностомозе, неоаскариозе, стронгилоидозе, эзофагостомозе, трихоцефалезе;
- лошадям при параскаридозе, оксиурозе, стронгилоидозе, желудочно-кишечных стронгилятозах;
- собакам и пушным зверям при токсаскариозе, токсокарозе и унцинариозе;
- птице при аскаридиозе, капилляриозе, гетеракидозе, амидостомозе и сингамозе;
- прудовой рыбе (карп, сазан и их гибриды, карась всех возрастных групп при промышленном выращивании в рыбоводных хозяйствах с кормом) для лечения и профилактики филометроидоза.

9. Противопоказания.
Не рекомендуется применение препарата быкам, баранам, хрякам-производителям.
Не применять препарат истощенным и больным инфекционными болезнями животным.
Запрещено применение препарата с фосфорорганическими соединениями.

10. Способ применения и дозы.
Препарат применяют групповым способом с кормом или водой свиньям, крупному рогатому скоту и мелкому рогатому скоту, лошадям, собакам, пушным зверям и птице однократно в дозах, указанных в таблице.
Рыбе корм с препаратом применяют из расчета 5% от массы рыбы методом группового скармливания 2 дня подряд.

Виды животных	Гельминтозы	Доза, мг/кг массы тела (по препарату)
Свиньи	аскариоз, трихоцефалез, эзофагостомоз, метастронгилез, стронгилоидоз, оллуланоз	50
Мелкий рогатый скот	диктиокаулез, желудочно-кишечные стронгилятозы, стронгилоидоз, трихоцефалез	50
Крупный рогатый скот	диктиокаулез, телязиоз, стронгилятозы желудочно-кишечного тракта, стронгилоидоз, буностомоз, трихоцефалез, эзофагостомоз, неоаскариоз	50
Лошади	параскаридоз; оксиуроз, стронгилоидоз, стронгилятозы желудочно-кишечного тракта	50 75
Собаки	токсаскариоз, токсокароз, унцинариоз	100
Пушные звери	токсаскариоз, токсокароз, унцинариоз	100
Птица	аскаридиоз, капилляриоз, гетеракидоз, амидостомоз и сингамоз	100
Прудовая рыба (карп, сазан и их гибриды, карась)	филометроидоз	4 кг препарата на 1 тонну комбикорма

11. Меры предосторожности при применении.
При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.
У истощенных и ослабленных животных возможно возникновение тремора мышц, слюнотечения, рвоты, диареи.
При возникновении указанных симптомов необходимо применить атропина сульфат в дозе 0,1 – 0,5 мг/кг массы тела животного (по ДВ) в зависимости от степени выраженности побочных эффектов.

13. Беременность и период лактации.
Не применять препарат в последнюю треть беременности,

14. Особые указания.
Преимагинальная дегельминтизация прудовой рыбы проводится в летний период (3 декада июля – 1 декада августа) при температуре воды не ниже 16-18°С.
Контроль эффективности дегельминтизации осуществляется путем сопоставления результатов паразитологического контроля при вскрытии 25 экз. сеголетка или 15 экз. старших возрастных групп до и через 2-3 дня после курса лечебного кормления рыб. При обнаружении живых нематод у рыб курс лечения повторяют.
Перед массовыми обработками каждую партию препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных или птицы. При отсутствии токсических явлений в течение 2 суток приступают к обработке всего поголовья.

15. Побочное действие.
При применении препарата в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений не выявлено.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.
Не применять препарат одновременно, в течение 14 дней до и после применения препаратов пирантел, морантел и фосфорорганических соединений.

17. Форма выпуска.
Пакеты из полимерных комбинированных материалов по 100, 500 г, 1 кг.
Мешки из бумаги и комбинированных материалов по 5, 10, 20, 25 кг.

18. Срок годности.
Срок годности - 3 (три) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.
Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°С до 25°С.
Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.
Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

Государственное учреждение
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР»

21. Условия уничтожения.
Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).
Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее чем через 10 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных. Молоко и яйцо для пищевых целей используют через четверо суток после дегельминтизации. Реализация товарной рыбы проводится не ранее, чем через 15 суток после последнего применения препарата.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата.
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».
Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарного лекарственного препарата.
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».
Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.
Адрес производства: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91/1, район д. Большой Тростенец.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».
Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.