СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 33 от 26.05.2026

# ИНСТРУКЦИЯ
## по применению ветеринарного лекарственного препарата «ТИЛОФАРМ 500»

1. Торговое наименование.
ТИЛОФАРМ 500.

2. Международное непатентованное наименование.
Тилозин (tylosin).

3. Регистрационный номер.
7335-10-20 БА.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Препарат представляет собой порошок от белого до желтого цвета, растворимый в воде.

5. Состав.
В 1 г препарата содержится 500000 МЕ тилозина тартрата и наполнитель (декстроза моногидрат).

6. Фармакотерапевтическая группа.
Антибактериальные средства. Антибиотики из группы макролидов.

7. Фармакодинамика и механизм действия.
Тилозина тартрат – активен в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов. Препарат оказывает бактериостатическое действие на *Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Bacillus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Corynebacterium spp., Pasteurella spp., Klebsiella spp., Listeria monocytogenes, Fusobacterium necrophorum, Clostridium spp., Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Haemophilus spp., Treponema spp., Rickettsia spp.* и на некоторые другие микроорганизмы.
Механизм действия препарата основан на ингибировании синтеза белка в микробной клетке, путем блокирования фермента транслоказы.
При пероральном поступлении антибиотик хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает практически во все органы и ткани организма. Наиболее высокий уровень тилозина достигается в легких, печени, молочных железах и почках. Терапевтическая концентрация антибиотика в крови после однократного применения препарата сохраняется в организме в течение 15 – 18 часов. Выделяется тилозин в основном с фекалиями, в меньшей степени с мочой и молоком.
Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.
ТИЛОФАРМ 500 применяют для лечения респираторного микоплазмоза у сельскохозяйственной птицы, инфекционного синусита у индеек, дизентерии и гастроэнтероколитах бактериальной этиологии у свиней, бронхопневмонии у телят, и других болезнях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тилозину.

9. Противопоказания.

Не рекомендуется применение животным, имеющим индивидуальную чувствительность к тилозину.

10. Способ применения и дозы.

ТИЛОФАРМ 500 телятам применяют индивидуально, внутрь с кормом или водой из расчета 10 – 20 мг/кг массы животного 2 раза в сутки до выздоровления (5 – 10 дней).

При дизентерии и гастроэнтероколитах бактериальной этиологии у свиней препарат назначают индивидуально или групповым способом в дозе 0,5 – 1,0 г на 1 литр воды (10 – 20 мг/кг массы) в течение 3 – 5 дней.

Птице препарат дают в дозе 1,0 г на 1 литр воды в течение 3 – 5 дней в зависимости от тяжести заболевания.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности. Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты.

12. Передозировка.

При передозировке препарата у животных может наблюдаться нарушение функции желудочно-кишечного тракта, снижение потребления корма.

13. Беременность и период лактации.

Особенностей действия препарата на беременных и лактирующих животных, а также на их потомство не выявлено.

14. Особые указания.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

15. Побочное действие.

В редких случаях у свиней после применения препарата возможны аллергические реакции, проявляющиеся в виде эритемы и зуда, которые проходят после отмены препарата

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Не рекомендуется одновременное применение с препаратами из групп пенициллина и цефалоспорина.

17. Форма выпуска.

Препарат выпускают в пакетах из полимерных комбинированных материалов по 100 г, 500 г и 1 кг.

18. Срок годности.

Срок годности - 3 (три) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5°С до 25°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Убой свиней и птицы на мясо, а также использование яиц для пищевых целей, разрешается не ранее чем через 8 суток после последнего применения препарата. Убой крупного рогатого скота разрешается через 14 суток после последнего назначения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых ранее указанного срока, используют на корм плотоядным животным.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарных лекарственных

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.