СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 33 от 26.05.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «ТРИМЕРАФАРМ-12%»

1. Торговое наименование.
ТРИМЕРАФАРМ-12%.

2. Международное непатентованное наименование.
Сульфамеразин (sulfamerazine), триметоприм (trimethoprim).

3. Регистрационный номер.
7339-10-20 БА.

4. Лекарственная форма.
Порошок для приема внутрь.
Описание. Препарат представляет собой мелкокристаллический порошок от белого до желтого цвета.

5. Состав.
В 1 г препарата содержится сульфамеразина 100,0 мг, триметоприма 20,0 мг и наполнитель (декстроза моногидрат).

6. Фармакотерапевтическая группа.
Антибактериальные средства. Сульфаниламиды в комбинациях.

7. Фармакодинамика и механизм действия.
Входящий в состав препарата сульфамеразин по принципу конкурентных взаимоотношений препятствует включению парааминобензойной кислоты в ферментные системы микробной клетки, нарушая тем самым синтез из нее дегидрофолиевой и глютаминовой кислот, а триметоприм ингибирует бактериальную редуктазу, превращающую дегидрофолиевую кислоту в тетрагидрофолиевую, которая необходима для синтеза пуринов и нуклеиновых кислот.
Оба компонента оказывают синергидный эффект, что обуславливает высокую антибактериальную активность в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Mycoplasma spp., Clostridium spp., Haemophilus spp., Bordetella spp.*
Препарат выводится из организма с мочой.
Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

8. Показания для применения.
ТРИМЕРАФАРМ-12% применяют для лечения поросят и телят при болезнях мочеполовой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта (особенно при сальмонеллезе, колибактериозе, пастереллезе), а также при других инфекциях, возбудители которых чувствительны к препарату.

9. Противопоказания.

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности животных к его составным компонентам. Не следует использовать для животных при заболеваниях почек, печени, органов кроветворения.

10. Способ применения и дозы.

Препарат применяют внутрь с кормом:

- поросятам - в дозе 0,2 г порошка на 1 кг массы тела 2 раза в день в течение 3-5 дней,
- телятам - в дозе 0,1 г порошка на 1 кг массы тела 2 раза в день в течение 3-5 дней.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности. Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты.

12. Передозировка.

При передозировке препарата у животного может наблюдаться снижение аппетита, угнетенное состояние, рвота, диарея.

13. Беременность и период лактации.

Не рекомендуется применение препарата беременным и лактирующим животным.

14. Особые указания.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

15. Побочное действие.

Побочные эффекты: анемия, лейкопения, тромбоцитопения.

При наличии побочных эффектов, аллергических реакций применение препарата прекращают и назначают животным препараты кальция и противоаллергические средства.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Запрещено применение препарата с парааминобензойной кислотой, прокаином и другими местными анестетиками. Препарат не следует применять с витаминами группы В из-за антогонистического действия на сульфаниламиды.

17. Форма выпуска.

Препарат выпускают в пакетах из полимерных комбинированных материалов по 100 г, 500 г и 1 кг.

18. Срок годности.

Срок годности - 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 4°С до 25°С.

Хранить в местах недоступных для детей.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения (сроки ожидания).

Убой животных на мясо разрешается через 12 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

24. Производитель ветеринарных лекарственных

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Адрес производства: Республика Беларусь, 223070, Минский р-н, поселок Михановичи, ул. Заводская, д.5.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТИНТЕРФАРМ».

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.

Фактический адрес: Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. 91, к.29, район д. Большой Тростенец.